



WAT KAN HET GEVOLG ZIJN VAN EEN LITTEKEN?

Littekens kunnen diverse klachten veroorzaken zoals:

- restrictie in de fascia wat zich uit in vastzittend weefsel
- verminderde bloed- en lymfestroom
- verzwakte spierkracht
- verstoorde energiedoorstroming (Qi)
- bewegingsbeperking in gewrichten

Ze kunnen vervelend aanvoelen, pijn doen of er lelijk uitzien. Ook kunnen ze ons emotioneel blokkeren door de traumatische gebeurtenis die het litteken veroorzaakt heeft.

Gelukkig is hier nu een oplossing voor.

McLOUGHLIN SCAR TISSUE RELEASE®

MSTR® IS EEN INNOVATIEVE, PIJNVRIJE, NATUURLIJKE METHODE OM LITTEKENS TE BEHANDELEN. INMIDDELS IS DOOR MIDDEL VAN ULTRASOUND ONDERZOEK BEWEZEN DAT NA 15 MINUTEN MSTR® HET LITTEKEN MET MEER DAN 30% VERBETERD IS.



ERVARINGS VERHALEN:

Vrouw van 50 jaar oud had meerdere littekens van spinale cervicale fusie (het vastzetten van nekwerfels), thoracale en lumbale werveloperaties, longchirurgie en een keizersnede: "Ik had vreselijke pijn. Nu doen geen van mijn littekens meer pijn. Het is 1.000 procent beter dan een jaar geleden. "

Vrouw van 19 jaar oud. Auto ongeval 2017 – zijwaartse aanrijding bij 120 km per uur. Veiligheidsgordel in haar linker onderbuik gesneden, maar zonder zichtbaar litteken! Ze voelt het wanneer ze zich uitstrekt, als ze lange afstanden loopt en soms in de sportschool. Cliënt voelde tintelingen op het taaie fibreuze weefsel tijdens de behandeling. Een week later, na slechts één behandeling, is het litteken zacht en trekt het niet meer tijdens het uitvoeren van activiteiten.

Man van 67 jaar oud. Na een driedubbele bypass 3 jaar geleden heeft hij een litteken van de nek tot de basis van het borstbeen en littekens op zijn benen waar de aders werden verwijderd. Na één sessie met MSTR-werk kon hij zijn armen weer naar achteren uitstrekken en ook gewichten optillen. Het litteken is bijna verdwenen. Na het werken aan de been-littekens kan hij langer lopen op de loopband in de sportschool.

McLoughlin Scar Tissue Release® wordt ingezet bij postoperatieve littekens zoals:

- borstamputatie, lumpectomie enz
- blindedarm operaties, galblaas enz
- keizersnede, hysterectomie.
- littekens door gewrichtsvervanging - knie, heup enz

En kan ook worden toegepast bij brandwondlittekens, trauma wonden, gezichtslittekens, spierscheuring enz.

Het helpt ook bij hielspoor!



fasciitis plantaris